

[肺がん] アリムタ+カルボプラチン+アバスチン(PEM+CBDCA+BV)

<1クール>

3週間

<投与スケジュール>

- ・アリムタ 1日目投与
- ・カルボプラチン 1日目投与
- ・アバスチン 1日目投与

<抗悪性腫瘍剤>

| 薬剤名略号 | 一般名 | 商品名 | 基準量 |
|-------|---------|------------------------------|----------------------|
| BV | ベバシズマブ | アバスチン点滴静注用400mg/100mg | 15mg/kg |
| PEM | ペメトレキセド | アリムタ注射用500mg/100mg | 500mg/m ² |
| CBDCA | カルボプラチン | カルボプラチン点滴静注液450/150/50mg「NK」 | AUC 5~6 |

<制吐剤>

グラニセトロン

オルガドロン

投与前日及び投与後2日目にリンデロン16錠/日を内服

<投与前のチェック>

B型肝炎(HBs抗原・HBc抗体・HBs抗体の検査必要)

アリムタ投与1週間前からメチコバル1mg筋注・パンビタン末内服 (メチコバルは9週ごと筋注、パンビタン末は連日内服)

アバスチンは手術後・出血リスクある場合は禁忌

<投与例>

①生食50mL (ルート確保)

①グラニセトロン点滴静注用100mL+オルガドロン注4A (30分) (→遅発性嘔吐予防でアロキシへの変更も可)

②アバスチン点滴静注用15mg/kg+生食100mL (初回90分 2回目以降は短縮化)

③アリムタ注射用500mg/m²+生食100mL (10分)

④カルボプラチン点滴静注液(AUC5~6)+生食250mL (60分~90分)

⑤生食50mL (フラッシュ)

※アバスチンの初回は90分かけて投与、特変なければ2回目は60分、3回目以降は30分へ短縮可能。

<特に注意すべき副作用>

- ・骨髄抑制(特に好中球減少)
- ・高血圧症(アバステン)
- ・出血(アバステン)

※宮崎生協病院 化学療法委員会作成 (問い合わせ先 TEL0985-24-6877)

[肺がん] アリムタ+カルボプラチン(PEM+CBDCA)

<1クール>

3週間

<投与スケジュール>

- ・アリムタ 1日目投与
- ・カルボプラチン 1日目投与

<抗悪性腫瘍剤>

| 薬剤名略号 | 一般名 | 商品名 | 基準量 |
|-------|---------|------------------------------|----------------------|
| PEM | ペメトレキセド | アリムタ注射用500mg/100mg | 500mg/m ² |
| CBDCA | カルボプラチン | カルボプラチン点滴静注液450/150/50mg「NK」 | AUC 5~6 |

<制吐剤>

グラニセトロン

オルガドロン

投与前日及び投与後2日目にリンデロン16錠/日を内服

<投与前のチェック>

B型肝炎(HBs抗原・HBc抗体・HBs抗体の検査必要)

アリムタ投与1週間前からメチコバル1mg筋注・パンビタン末内服 (メチコバルは9週ごと筋注、パンビタン末は連日内服)

<投与例>

①生食50mL (ルート確保)

②グラニセトロン点滴静注用100mL+オルガドロン注4A (30分) (→遅発性嘔吐予防でアロキシへの変更も可)

③アリムタ注射用500mg/m²+生食100mL (10分)

④カルボプラチン点滴静注液(AUC5~6)+生食250mL (60分~90分)

⑤生食50mL (フラッシュ)

<特に注意すべき副作用>

・骨髄抑制(特に好中球減少)

※宮崎生協病院 化学療法委員会作成 (問い合わせ先 TEL0985-24-6877)

[肺がん] アブラキサン+カルボプラチン(nabPTX+CBDCA)

<1クール>

4週間

<投与スケジュール>

・アブラキサン 1日目、8日目、15日目投与

・カルボプラチン 1日目投与

※3週投与、1週休薬

<抗悪性腫瘍剤>

| 薬剤名略号 | 一般名 | 商品名 | 基準量 |
|---------|---------|------------------------------|----------------------|
| nab-PAC | アブラキサン | アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg/m ² |
| CBDCA | カルボプラチン | カルボプラチン点滴静注液450/150/50mg「NK」 | AUC 6 |

<制吐剤>

グラニセトロン

オルガドロン

<投与前のチェック>

B型肝炎(HBs抗原・HBc抗体・HBs抗体の検査必要)

アブラキサン同意書(血液製剤のため)

<投与例>

①生食50mL (ルート確保)

②グラニセトロン点滴静注用100mL+オルガドロン注2A (30分)

③アブラキサン点滴静注用100mg/m²+生食50mL (30分)

④カルボプラチン点滴静注液(AUC5~6)+生食250mL (1時間)

⑤生食50mL (フラッシュ)

<特に注意すべき副作用>

・骨髄抑制(特に好中球減少)

・末梢神経障害(アブラキサン)

※宮崎生協病院 化学療法委員会作成 (問い合わせ先 TEL0985-24-6877)

[肺がん] ドセタキセル (DTX)

<1クール>

3週間

<投与スケジュール>

・ドセタキセル 1日目投与

<抗悪性腫瘍剤>

| 薬剤名略号 | 一般名 | 商品名 | 基準量 |
|-------|--------|----------------------|---------------------|
| DTX | ドセタキセル | ドセタキセル80mg/20mg「ニプロ」 | 60mg/m ² |

<制吐剤>

グラニセトロン

オルガドロン

<投与前のチェック>

B型肝炎(HBs抗原・HBc抗体・HBs抗体の検査必要)

<投与例>

① 生食50mL (ルート確保)

② グラニセトロン注3mg+オルガドロン注5A (20分)

③ ドセタキセル点滴静注(60mg/m²)+生食250mL (1時間)

④ 生食50mL (フラッシュ)

<特に注意すべき副作用>

・骨髄抑制(特に好中球減少)

※宮崎生協病院 化学療法委員会作成 (問い合わせ先 TEL0985-24-6877)