

## [胃がん] パクリタキセル＋サイラムザ

<1クール>

4週間

<投与スケジュール>

- ・パクリタキセル day1,8,15(22は休薬)
- ・サイラムザ day1,15

<抗悪性腫瘍剤>

薬剤名略号	一般名	商品名	基準量
wPTX	パクリタキセル	パクリタキセル注30mg/100mg	80mg/m <sup>2</sup>
RAM	ラムシルマブ	サイラムザ100mg/500mg	8mg/kg

<制吐剤>

オルガドロン注射液

<投与前のチェック>

B型肝炎(HBs抗原・HBc抗体・HBs抗体の検査必要)

<投与例 (day1,15) >

- ①生食50mL (ルート確保)
- ②レスタミンコーワ10mg 5錠 (内服)
- ③生食100mL+ファモチジン注20mg1A+オルガドロン注1.9mg4A (30分点滴静注)
- ④サイラムザ点滴静注8mg/kg+生食250mL (1時間)
- ⑤生食250mL(1時間点滴静注 2クール目までは必須 Infusion Reactionの観察期間)
- ⑥パクリタキセル注80mg/m<sup>2</sup>+5%糖液250mL (1時間)
- ⑦生食50mL (フラッシュ)

<投与例 (day8) >

- ①生食50mL (ルート確保)
- ②レスタミンコーワ10mg 5錠 (内服)
- ③生食100mL+ファモチジン注20mg1A+オルガドロン注1.9mg4A (30分点滴静注)
- ④パクリタキセル注80mg/m<sup>2</sup>+5%糖液250mL (1時間)
- ⑤生食50mL (フラッシュ)

<注意すべき副作用>

- ・骨髄抑制(特に好中球減少)
- ・末梢神経障害(パクリタキセル)
- ・高血圧症(サイラムザ)

※宮崎生協病院 化学療法委員会作成 (問い合わせ先 TEL0985-24-6877)

## [胃がん] エスワン+オキサリプラチン(SOX)

<1クール>

3週間

<投与スケジュール>

・オキサリプラチン 1日目投与

・エスワン day1夕～day15朝まで内服(その後休薬)

day22～2クール目開始

薬剤名略号	一般名	商品名	基準量
L-OHP	オキサリプラチ	オキサリプラチン100mg/50mg	100mg/m <sup>2</sup>
S1	エスワン	エスワンタイホウ20mg/25mg	80mg/m <sup>2</sup> /日

<制吐剤>

オルガドロン

グラニセトロン

リンデロン錠(0.5mg 16T 1日2回朝食後 day2-3)

<投与前のチェック>

B型肝炎(HBs抗原・HBc抗体・HBs抗体の検査必要)

<投与例>

①生食50mL (ルート確保)

②グラニセトロン+オルガドロン5A (30分点滴静注)

③オキサリプラチン100mg/m<sup>2</sup>+5%糖液250mL (2時間点滴静注)

④生食50mL (フラッシュ)

⑤内服 エスワンタイホウ80mg/m<sup>2</sup>/日 (day1夕～)

⑥day2-3 リンデロン錠0.5mg 16T 1日2回朝食後

<特に注意すべき副作用>

・骨髄抑制(特に好中球減少)

・末梢神経障害(オキサリプラチン)

・下痢や食欲低下(エスワン)

※宮崎生協病院 化学療法委員会作成 (問い合わせ先 TEL0985-24-6877)

## [胃がん] エスワン+オキサリプラチン+トラスツズマブ(SOX+Tmab)

<1クール>

3週間

<投与スケジュール>

- ・オキサリプラチン 1日目投与
- ・トラスツズマブ 1日目投与
- ・エスワン day1夕～day15朝まで内服(その後休薬) 2週間内服後、1週間休薬

薬剤名略号	一般名	商品名	基準量
L-OHP	オキサリプラチン	オキサリプラチン100mg/50mg	100mg/m <sup>2</sup>
S1	エスワン	エスワンタイホウ20mg/25mg	80mg/m <sup>2</sup> /日
Tmab	トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回 8mg/kg
Tmab	トラスツズマブ	トラスツズマブ	2回目以降 6mg/kg

<制吐剤>

- オルガドロン
- グラニセトロン
- アロキシ
- リンデロン錠 8T(day2～3)

<投与前のチェック>

- B型肝炎(HBs抗原・HBc抗体・HBs抗体の検査必要)
- HER2陽性の確認

<投与例>

- ① 生食50mL (ルート確保)
- ② 生食100mL+アロキシ1V+オルガドロン5A (30分点滴静注)
- ② トラスツズマブBS点滴静注用 +生食100mL (30分点滴静注)
- ③ オキサリプラチン100mg/m<sup>2</sup>+5%糖液500mL (2時間点滴静注)
- ④ 生食50mL (フラッシュ)
- ⑤ 内服 エスワンタイホウ80mg/m<sup>2</sup>/日 (day1夕～)

<注意すべき副作用>

- ・骨髄抑制(特に好中球減少)
- ・末梢神経障害(オキサリプラチン)
- ・下痢、食欲低下などの消化器症状(エスワン)

※宮崎生協病院 化学療法委員会作成 (問い合わせ先 TEL0985-24-6877)